

THE CONDOR
Vol. 103, Número 2
Mayo 2001
RESUMENES

COMENTARIOS

Es *Spizella taverneri* un Especie o un Subespecie? ¹

ERNST MAYR²

Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Cambridge, MA 02138

NED K. JOHNSON³

Museum of Vertebrate Zoology and Department of Integrative Biology, University of California, Berkeley, CA 94720-3160

¹Received 8 December 1999. Accepted 9 November 2000.

²E-mail: emayr@oeb.harvard.edu

³Corresponding author. E-mail: neddo@socrates.berkeley.edu

Resumen. Usando datos de distribución, ecológicos, morfológicos, y de vocalización, Klicka y colaboradores (1999) argumentaron a favor de reconocer a nivel de especie la forma *taverneri*, la cual ha sido considerada por mucho tiempo una subespecie del gorrión de Brewer (*Spizella breweri*). Nosotros diferimos de esta conclusión por varias razones: ausencia de evidencia de aislamiento reproductivo entre *taverneri* y *breweri*, pérdida de información sobre la relación evolutiva íntima y la distribución alopátrica de los dos taxones que acompañarían su elevación a nivel de especie, y violación del principio de balance taxonómico. Hasta que no se demuestre la existencia de diferencias relevantes en vocalización y formación y mantenimiento de parejas, es mejor considerar a *taverneri* y a *breweri* como subespecies reproductivamente compatibles.