

The Condor
Volumen 109, Número 2
Mayo 2007
Resúmenes

ARTÍCULOS

Comportamiento y Posición Filogenética de los *Premnoplex* (Furnariidae)

JUAN IGNACIO ARETA^{1,2,3}

¹CICyTTP-CONICET, Materi y España, 3105, Diamante, Entre Ríos, Argentina

²Grupo FALCO, El Coronillo, Reserva Natural Punta Lara, 1915, Ensenada, Buenos Aires, Argentina

Manuscript received 11 July 2006; accepted 9 January 2007.

³ E-mail: esporofila@yahoo.com.ar

Resumen. El ensamble *Margarornis* incluye cuatro géneros: *Margarornis*, *Premnoplex*, *Premnornis* y *Roraimia*, aparentemente cercanamente emparentados. Las diferencias de hábitat y voces de *Premnoplex brunnescens* y de *P. tatei* son consistentes con su estatus específico. A la luz de la débil evidencia anatómica (músculatura apendicular) apoyando la inclusión de *Premnornis* en el ensamble *Margarornis*, la naturaleza convergente de los caracteres asociados a los hábitos trepadores y las diferencias en comportamiento y nidificación, propongo que *Premnornis* no es un miembro del ensamble *Margarornis* y que *Premnoplex* estaría solamente cercanamente emparentado a *Margarornis*. Estos resultados son congruentes con recientes estudios moleculares. Aunque *Roraimia* difiere en plumaje, forma de la cola y canto de otros miembros del ensamble *Margarornis*, debe ser provisionalmente incluido en él hasta que más evidencia aclare su posición filogenética.